Vertissements agricoles | SSN 0751-154 X ®

Bulletin technique n° 16 du 19 juin 1990

Abonnement annuel: 190 F

* BETTEVAVE : les pucerons noirs en progression

* CEREALES A PAILLE : la fin des traitements insecticides

* MAIS : le tout début du vol de la Pyrale

* TOURNESOL : hors d'atteinte des pucerons

* LEGUMES : évolution de la Mouche de l'Asperge et de la Teigne du Poireau

** BETTERAVE **

----PUCERONS

- * SITUATION : une augmentation notable des populations de pucerons noirs est observée depuis la semaine dernière dans les cultures de Betterave.
- * PRECONISATION : surveillez attentivement le niveau des infestations et l'activité des insectes auxiliaires. Après un état des lieux indispensable, un traitement est réalisable si les auxiliaires ne peuvent contenir de fortes populations.

** CEREALES A PAILLE **

----MALADIES FOLIAIRES

- * SITUATION : l'Oïdium, la Septoriose et la Rouille brune sont toujours présents en de nombreuses parcelles.
- * PRECONISATION : au stade actuel des céréales, ces maladies ne sont plus nuisibles et tout traitement fongicide est exclus.

----PUCERONS

- * SITUATION : certaines parcelles sont entièrement colonisées par les pucerons des épis.
- * PRECONISATION : de façon générale, tout traitement insecticide est déconseillé : aucun gain de rendement ne peut être espéré en parcelle infestée. Seules les parcelles fortement attaquées pourraient encore faire l'objet d'un traitement en cas de retour de la chaleur afin d'éviter une dépréciation de la récolte par le miellat et la fumagine qui risquent de se développer sur les épis dans de telles conditions. Ces traitements tardifs ne sauraient être qu'exceptionnels et, dans tous les cas, il conviendra de vérifier le délai d'emploi du produit avant la moisson (consultez les étiquettes!).

7408

Imprimerie de la Station de STRASBOURG Directeur-Gérant : P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE D. R. A. F. Service Régional de la Protection des Végétaux

Cité Administrative 67084 STRASBOURG CEDEX & 88. 37. 32. 18 Bas-Rhin: 88.69.65.89 - Haut-Rhin: 89.72.49.70



** MAIS **

---PUCERONS

* SITUATION : les infestations de pucerons sont faibles dans les Maïs.

* PRECONISATION: toute intervention aphicide est exclue. Laissez le temps aux auxiliaires de s'installer dans vos cultures.

----PYRALE

- * SITUATION:
- ► En cages d'elevage : le phénomène de chrysalidation amorcé début juin est freiné par le rafraichissement des températures : l'I.N.R.A. de Colmar dénombre 15 % de chenilles chrysalidées dans sa cage.

► Au piège sexuel de Wiwersheim : 4 papillons mâles ont été capturés entre le 16 et le 18 juin.

* PRECONISATION : il est trop tôt pour intervenir contre la Pyrale. Les agents de la Station d'Avertissements Agricoles entreprennent les premiers contrôles de pontes. Consultez les prochains bulletins.

** POIS **

----TORDEUSES

* SITUATION : les tous premiers papillons sont capturés au piège de Saint-Louis.

* PRECONISATION : tout traitement serait prématuré. Attendez les prochains bulletins pour de plus plus amples informations.

----DIVERS

Des symptômes d'Anthracnose sont signalés dan les parties basses et médianes du Pois de la parcelle d'observation de Saint-Louis.

** TOURNESOL **

----PUCERONS

* SITUATION : les populations de pucerons du Tournesol restent limitées. Le stade "bouton étoilé", repère de la fin de la période de forte sensibilité du Tournesol aux pucerons, est très fréquemment atteint.

* PRECONISATION : sauf cas de pullulation exceptionnelle, toute intervention est à présent inutile.

** LEGUMES **

----MOUCHE DE L'ASPERGE

* SITUATION: le vol de la Mouche se poursuit à Berstett (10 captures du 9 au 15 juin) et à Griesheim-sur-Souffel (52 captures du 3 au 10 juin). Les captures sont encore faibles à Algolsheim.

* PRECONISATION : la couverture insecticide des aspergeraies doit être maintenue, particulièrement dans le Bas-Rhin.

----TEIGNE DU POIREAU

- * SITUATION : le vol se poursuit à Sélestat. Les premières captures sont enregistrées à Village-Neuf.
 - * PRECONISATION: maintenez la protection.